



Ламбдацизм.




Его исправление.

Ламбдацизм - недостатки произношения звуков Л и Л*.

Ламбдацизм	
	
Рис. 24. Межзубный	Рис. 25. Носовой

Параламбдацизм - разновидность дефекта, которая выражается в замене звуков Л и Л* какими-либо другими.

Обычно неверно произносится лишь твердый Л.

Параламбдацизмы			
			
Рис. 26. Л=В	Рис. 27. Л=У	Рис. 28. Л=j [Й]	Рис. 29. Л=Ы

Разновидности недостатков произношения Л:

1. Удлинение смежных гласных (аампа - лампа, паака - палка, стоо - стол)
2. Произнесение Л в виде краткого гласного звука типа Ы (ыампа - лампа, паыка - палка, стоы - стол)
3. Замена Л фонемой Й (йампа - лампа, пайка - палка, стой - стол)
4. Замена Л фонемой Н (нампа, панка, стон)
5. Произнесение Л в виде заднеязычного носового звука НГ (нгампа, нгапа - лапа).
6. *Произнесение в качестве Л звука В или краткого У, при этом язык оттянут в глубь рта, как при гласном У.*

Основная причина - укороченная подъязычная уздечка.

Исправление ламбдацизма.

1. смотрясь в зеркало, свободно высунуть язык и зажать его между зубами.
2. не меняя положение языка протянуть А или Ы.
3. логопед формулирует инструкцию, показывает - при таком же положении органов должен получиться звук Л.
4. произнесение звука в слогах с гласным А: в закрытом слоге АЛ, между гласными - АЛА, в закрытом слоге- АЛ.
5. вводим слоги с гласными Ы, О, У
6. Л* ставится от Л с помощью слогов с гласными И, Е.
7. сопоставление слогов с Л и Л* (ла - ля, ло - лё)
8. в случае параламбдацизма проводим упражнения на выработку дифференциации нового звука и того, которым он заменялся.